زوكور®

(١٠،٢٠،٤٠ مجم سيمڤاستاتين) اقـــراص مغلفـــة

يُرجى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها قد تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، فاستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- تم وصف هذا الدواء لك، فلا تعطه لآخرين؛ فقد يضـــر بهم، حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني أنت منها.
- إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك. ويشمل ذلك أية آثار جانبية مُحتملة؛ غير المُدرجة في هذه النشرة، انظر قسم ٤.

محتويات هذه النشرة:

١. ما هو عقار زوكور؟ وفيم يُستخدم؟
٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار زوكور؟
٣. كيفية تناول عقار زوكور.
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية تخزين عقار زوكور
٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. ما هو عقار زوكور؟ وفيم يُستخدم؟

يحتوي عقار زوكور على المادة الفعالة سيمڤاستاتين. زوكور هو دواء يُستخدم لخفض مستويات الكوليسترول الكلي، والكوليسترول "الضار" (كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "LDL")، والمواد الدهنية التي تُعرف بـ "الدهون الثلاثية" الموجودة في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يزيد عقار زوكور من مستويات الكوليسترول "المفيد" (كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة "HDL"). يتنمي عقار زوكور إلى فئة من الأدوية تُعرف بـ "الستاتينات".

الكوليسترول هو واحد من العديد من المواد الدهنية الموجودة في الدورة الدموية. يتكون الكوليسترول الكلي أساسًا من الكوليسترول منخفض الكثافة والكوليسترول عالي الكثافة. عادةً ما يُسمى الكوليسترول منخفض الكثافة بالكوليسترول "الضار"؛ لأنه يمكن أن يتراكم على جدران الشرايين مشكلًا لويحة. وفي النهاية يمكن أن يُؤدي تراكم المواد الدهنية هذه إلى تضيُّق الشرايين. هذا التضيُّق يُمكن أن يبطئ أو يمنع تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والمخ. يمكن أن يؤدي منع تدفق الدم هذا إلى حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

عادةً ما يُسمى الكوليسترول عالي الكثافة بالكوليسترول "المفيد"؛ لأنه يمنع الكوليسترول الضار من التراكم في الشرايين وبقي من أمراض القلب.

تُعد الدهون الثلاثية شكلًا آخر من الدهون الموجودة بالدم، فهي قد تُزيد من مخاطر حدوث مرض بالقلب.

يجب عليك اتباع نظام غذائيّ خافض للكوليسترول أثناء تناول هذا الدواء. يُستخدم عقار زوكور إلى جانب النظام الغذائي الخافض للكوليسترول إذا كنت تعاني من الآتي:

- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم (ارتفاع كوليسترول الدم الأولي)، أو ارتفاع مستويات الدهون في الدم (فرط دهون الدم من النوع المختلط).
- مرض وراثي (فرط كوليسترول الدم العائلي متجانس الجينات) يرفع من مستوى الكوليسترول لديك في الدم. قد يتم أيضًا إعطاؤك علاجات أخرى.
- أحد أمراض القلب التاجية "CHD" أو كانت لديك مخاطر مرتفعة للإصابة بأمراض القلب التاجية (لأنك تعاني من مرض السـكري، أو لأن لديك تاريخًا مرضيًا للإصابة بالسكتة الدماغية، أو غيرها من أمراض الأوعية الدموية). قد يطيل عقار زوكور من عمرك عن طريق الحد من خطر التعرض لمشاكل أمراض القلب، بغض النظر عن كمية الكوليسترول الموجودة في الدم.

في معظم الأشخاص، لا تظهر أية أعراض فورية نتيجة لارتفاع الكوليسترول في الدم. يمكن لطبيبك قياس نسبة الكوليسترول لديك من خلال اختبار بسيط بالدم. قم بزيارة طبيبك بانتظام، وتابع مستوى الكوليسترول لديك باستمرار، وتأكد من مناقشة أهدافك العلاجية مع الطبيب الخاص بك.

٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار زوكور؟

لا تتناول عقار زوكور في الحالات الآتية:

- إذا كنت تعاني من حســاسية تجاه سيمڤاستاتين أو أيّ من المكونات الأخرى بهذا الدواء (المدرجة بقسم ٦: محتويات العبوة ومعلومات أخرى).
- إذا كنت تُعاني حاليًا من مشاكل بالكبد.
- إذا كنتِ حاملًا أو مُرضعًا.
- إذا كنت تتناول دواءً (أدوية) يحتوي (تحتوي) على واحدةٍ أو أكثر من المواد الفعالة التالية:
  - إتراكونازول أو كيتوكونازول أو پوساكونازول أو فوريكونازول (يُستخدم لعلاج العدوى الفطرية)
  - إريثروميسين أو كلاريثروميسين أو تيليثروميسين (يُستخدم لعلاج العدوى)
  - مثبطات إنزيم البروتياز الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية مثل إندينافير، نلفينافير، ريتونافير، وساكوينافير (تستخدم مثبطات إنزيم البروتياز الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية).
  - بوسيرافير أو تيلاربفير (يُستخدم لعلاج عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع "سي")
  - نيفازودون (يُستخدم في علاج الاكتئاب)
  - كوبيسيستات
  - جيمفيبروزيل (يُستخدم في المرضى الخاضعين لعمليات زرع أعضاء)
  - سيكلوسبورين (يُستخدم في المرضى الخاضعين لعمليات زرع أعضاء)
  - دانازول (هرمون من صنع الإنسان) يُستخدم لعلاج انتباذ بطانة الرحم، وهي حالة تنمو فيها بطانة الرحم خارج الرحم).
- إذا كنت تتناول أو قد تناولت خلال السـبعة أيام الأخيرة أو أُعطيت دواءً يُسمى حمْض الفوسيديك (يُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية).

لا تتناول أكثر من ٤٠ مجم من عقار زوكور إذا كنت تتناول لوميتابايد (يُستخدم لعلاج الحالات الخطيرة والنادرة للكوليسترول الوراثي).

استشر طبيبك إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان دواؤك قد ورد بقائمة الأدوية المذكورة أعلاه.

تحذيرات واحتياطات

أخبر طبيبك:

- أخبر طبيبك عن كل الحالات الطبية التي تعاني منها بما في ذلك الحساسية.
- أخبر طبيبك إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكحوليات.
- إذا كنت تعاني من مرض كبدي. فقد يكون عقار زوكور غير مناسب لك.
- أخبر طبيبك إذا كنت بصـدد الخضـوع لعملية جراحية. فقد تحتاج إلى التوقف عن تناول أقراص عقار زوكور لفترة قصيرة.
- إذا كنت أسيوًا، لأنه قد تتطبق عليك جرعة مختلفة

يجب أن يُجري لك طبيبك اختبارًا بالدم قبل أن تبدأ في تناول عقار زوكور وإذا عانيت من أي أعراض لمشـاكل في الكبد أثناء تناولك لعقار زوكور. وذلك للتحقق من مدى كفاءة عمل الكبد لديك.

قد يرغب طبيبك أيضًا في إجراء فحوصـات بالدم للتحقق من مدى كفاءة عمل الكبد لديك بعد بدء تناول عقار زوكور.

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو معرضًا للإصابة به، فسيقوم طبيبك بمتابعتك عن كثب أثناء الفتـرة التـي تتناول فيها هذا الدواء. من المحتمل أن تكون معـرضًا لخطـر الإصابة بمرض السكري إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات السكر والدهون في الدم، أو زيادة في الوزن، وارتفاع ضغط الدم.

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مرض رئوي شديد.

اتصـل بطبيبك على الفور إذا عانيت من ألم، أو أوجاع أو ضعف بالعضـلات لا يمكن تفسيره؛ وذلك لأنه في حالات نادرة، يمكن لمشاكل العضلات أن تكون خطيرة، ويشمل ذلك تحلل العضـلات الذي يؤدي إلى حدوث تلف بالكلى، وقد حدثت حالات وفاة بشـكل نادر جدًا.

تكون مخاطر تحلل العضـــلات أكبر عند تناول جرعات مرتفعة من عقار زوكور، وخاصة جرعة ٤٠ مجم. تكون أيضًا مخاطر تحلل العضلات أكبر في بعض المرضى. تحدث مع طبيبك إذا كان ينطبق عليك أيًا مما يلي:

- إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكحوليات.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية.
- إذا كنت تبلغ من العمر ٦٥ عامًا أو أكثر.
- إذا كنت أنثى.
- إذا عانيت مسبقًا من مشاكل بالعضلات خلال العلاج باستخدام الأدوية الخافضة للكوليسترول والتي تُعرف بـ "الستاتينات" أو الفايبرات.
- إذا كنت (أنت أو أحد أفراد العائلة المقربين) تعاني من اضـــطراب وراثي بالعضلات.

أخبر أيضًا طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تُعاني ضعفًا مستمرًا بالعضلات. قد يستلزم الأمر اختبارات وأدوية إضافية لتشخيص وعلاج ذلك.

الأطفال والمراهقون

تمت دراسة آمان وفعّالية عقار زوكور في الفتيان من عمر ١٠ - ١٧ عامًا والفتيات اللواتي قد بدأت فترة الحيض لديهن قبل سنة واحدة على الأقل (انظر قسم ٣: "كيفية تناول عقار زوكور"). لم تتم دراسة عقار زوكور في الأطفال ممن تقل أعمارهم عن ١٠ سنوات. للحصول على مزيد من المعلومات، تحدّث إلى طبيبك.

تناوُل أدوية أخرى مع عقار زوكور

أبلغ طبيبك إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي دواء (أدوية) آخـــر (أخـرى) بهأي من المواد الفعّالة التالية. فتناوُل عقار زوكور مع أي من هذه الأدوية قد يُزيد من مخاطر حدوث مشاكل بالعضلات (بعضها قد تم بالفعل سرده في قسم "لا تتناول عقار زوكور" أعلاه).

- سيكلوسبورين (يُستخدم عادةً في المرضى الخاضعين لعمليات زرع أعضاء)
- دانازول (هرمون من صنع الإنسان) يُستخدم لعلاج انتِباذ بطانة الرحم، وهي حالة تنمو فيها بطانة الرحم خارج الرحم).
- الأدوية التـي بها مادة فعالة مثل إتـراكونازول أو كيتوكونازول أو فلوكونازول أو پوساكونازول أو فوريكونازول (تُستخدم لعلاج العدوى الفطرية)
- الفايبرات التي بها مادة فعالة مثل جيمفيبروزيل وبيز افايبرات (تُستخدم لخفض نسبة الكوليسترول)
- الـعقاقير إريثروميسـين، أو كلاريثروميسـين، أو تليثروميسـين، أو حمض الفيوسيديك (تُستخدم في علاج العدوى البكتيرية). لا تتناول حمْض الفوسيديك أثناء استخدام هذا الدواء. انظر أيضًا قسم ٤.
- مثبطات إنزيم البروتياز الخاص بفيروس نقص المناعة البشـري مثل إندينافير ونيلفينافير وريتونافير وساكوينافير (تُستخدم لعلاج مرض "الإيدز").
- بوسيرافير أو تيلاربفير (يُستخدم لعلاج عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع "سي")
- نيفازودون (يُستخدم في علاج الاكتئاب)
- الأدوية التي بها المادة الفعالة كوبيسيستات
- أميودارون (يُستخدم في علاج عدم انتظام ضربات القلب)
- فيرابامول، وديلتيازيم، أو أملوديبين (تُستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع، الآلام الصدرية المرتبطة بأمراض القلب، أو بعض حالات أمراض القلب الأخرى).
- لوميتابايد (يُستخدم لعلاج الحالات الخطيرة والنادرة للكوليسترول الوراثي).
- كولشيسين (يستخدم في علاج مرض النقرس).

بالإضافة إلى الأدوية المذكورة أعلاه، أخبر الطبيب أو الصـيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية. وعلى وجه الخصوص، أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية:

- أدوية لمنع تخثر (تجلط) الدم، مثل وارفارين أو فينوبروكومون أو أسيتوكومارُول (مضادات التجلط).
- فينوفايبرات (يُستخدم أيضًا لخفض نسبة الكوليسترول).
- نياسين (يُستخدم أيضًا لخفض نسبة الكوليسترول).
- ريفامبيسين (يستخدم في علاج السل).

يجب أيضًا أن تخبر أي طبيب يصف لك دواءً جديًا بأنك تتناول عقار زوكور.

تناوُل عقار زوكور مع الأغذية والمشروبات

يحتوي عصـير الجريب فروت على واحد أو أكثر من المكونات التي من شأنها أن تُغير من الطريقة التي يستخدم بها الجسم بعض المنتجات الدوائية، بما في ذلك عقار زوكور؛ لذا يجب تجنب تناول عصير الجريب فروت.

الحمل والرضاعة الطبيعية

لا تتناولي عقار زوكور إذا كنتِ حاملًا أو تنوين الحمل أو تعتقدين بأنك قد تكونين حاملًا. إذا أصبحتِ حاملًا أثناء تناوُل عقار زوكور، فتوقفي على الفور عن تناوله واستشـيري طبيبك. لا تتناولي عقار زوكور إذا كنتِ مرضـعًا؛ وذلك لأنه من غير المعروف ما إذا كان يتم مرور هذا الدواء إلى لبن الأم.

استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

القيادة واستخدام الآلات

من غير المتوقع أن يُؤثر عقار زوكور في قدرتك على القيادة أو اسـتخدام الآلات. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بعض الأشخاص قد يصابون بدوخة بعد تناولهم لعقار زوكور.

يحتوي عقار زوكور على سكر اللاكتوز.

تحتوي أقراص عقار زوكور على سـكر الـ "لاكتوز". إذا كان طبيبك قد أخبرك بأنك لا تتحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل به قبل تناول هذا المنتج الدوائي.

٣. كيفية تناول عقار زوكور

سيحدد طبيبك تركيز الأقراص المناسب لك، بناء على حالتك والعلاج الحالي الخاص بك ووضع المخاطر الشخصية بالنسبة لك.

تناول دائمًا هذا الدواء كما أخبرك طبيبك بالضبط. يُرجى مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من كيفية التناول.

يجب عليك اتباع نظام غذائيّ خافض للكوليسترول أثناء تناول عقار زوكور.

الجرعة:

جرعة عقار زوكور هي قرص واحد ١٠مجم أو ٢٠ مجم، أو ٤٠ مجم مرة واحدة في اليوم عن طريق الفم.

البالغون:

جرعة البداية المعتادة هي ١٠، ٢٠، أو في بعض الحالات؛ ٤٠ مجم في اليوم. قد يقوم طبيبك بضبط الجرعة بعد ٤ أسابيع على الأقل لجرعة أقصـاها ٤٠ مجم في اليوم. لا تتناول أكثر من ٨٠ مجم في اليوم.

قد يصف طبيبك جرعات أقل، وخاصة إذا كنت تتناول بعض المنتجات الدوائية المذكورة أعلاه أو تعاني من حالات معينة في الكلى.

يُوصى بتناوُل الجرعة التي تبلغ ٨٠ مجم فقط في المرضى البالغين الذين لديهم مستويات الكولسـتيرول مرتفعة جدًا والمعرضين بنسـبة كبيرة لخطر الإصابة بأمراض القلب والذين لم يتم الوصول لمستويات الكولسترول المرجوة لديهم بجرعات أقل.

الاستخدام في الأطفال والمراهقين:

بالنسبة للأطفال (من ١٠ - ١٧ سنة)، فإن جرعة البدء المعتادة الموصى بها هي ١٠ مجم يوميًا في المساء. الجرعة القصوى الموصى بها هي ٤٠ مجم في اليوم.

طريقة التناول:

تناول عقار زوكور في المساء. يمكنك تناول عقار زوكور مع الطعام أو دونه. استمر في تناول عقار زوكور ما لم يخبرك طبيبك أن تتوقف.

إذا كان طبيبك قد قام بوصف عقار زوكور مع أحد العقاقير العازلة للحمض الصـفراوي (من الأدوية الأخرى الخافضة للكوليسترول)، فيجب أن تتناول عقار زوكور قبل تناول الدواء العازل للحمض الصفراوي بساعتين على الأقل أو بعده بأربع ساعات.

إذا تناولت كمية من عقار زوكور أكثر مما يجب

يُرجى الاتصال بطبيبك أو الصيدلي.

إذا أغفلت تناوُل عقار زوكور

- لا تتناول جرعة مُضـاعَفة لتعويض قرص أغفلته. فقط تناول جرعتك المعتادة من عقار زوكور في الوقت المعتاد من اليوم التالي.

إذا توقفت عن تناوُل عقار زوكور.

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي، لأن مستوى الكوليسترول قد يرتفع مرة أخرى.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استخدام هذا المنتج، فاستشر طبيبك أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المُحتملة

مثل كافة الأدوية، قد يسـبب عقار زوكور آثارًا جانبية، على الرغم من أنها لا تحدث للجميع. تصف المصطلحات التالية معدل الإبلاغ عن حدوث الآثار الجانبية:

- نادرة (في ما يصل إلى ١ من كل ١٠٠٠ شخص).
- نادرة جدًا (في ما يصل إلى ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص).
- غير معروفة (لا يمكن تقدير تكرار الأعراض الجانبية من البيانات المتاحة)

تم الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة نادرة الحدوث وهي كالتالي:

إذا حدث أي من هذه الآثار الجانبية الخطيـرة، فتوقف عن تناول الدواء وأخبـر طبيبك فورًا أو اذهب إلى قسم الطوارئ بأقرب مستشفى.

- ألم أو أوجاع أو ضعف أو تقلصات بالعضلات. وذلك لأنه في حالات نادرة، يُمكن لمشاكل العضلات أن تكون خطيرة، ويشمل ذلك تحلل العضلات الذي يؤدي إلى حدوث تلف بالكلى؛ وقد كانت هناك حالات نادر جدًا لحدوث الوفاة.
- تفاعلات فرط الحساسية (الحساسية) ومن بينها:
  - تورم الوجه واللسان والحلق مما قد يسبب صعوبة في التنفس.
  - ألم شديد بالعضلات يكون عادة في الكتفين والوركين.
  - طفح جلدي مصحوب بضعف في الأطراف وعضلات الرقبة.
  - الام أو التهاب المفاصل (ألم العضلات الرُوماتزميّ).
  - التهاب الأوعية الدموية.
  - ظهور كدمات غير معتادة، طفح جلدي وتورم، شرى (أرتيكاريا)، حساسية الجلد للشمس، حمى، احمرار.
  - ضيق التنفس وشعور بالإعياء
  - ظهور مرض شبيه بالذئبة (يتضـــمن طفحًا جلديًا، اضطرابات بالمفاصل، وتأثيرات على كريات الدم).
- التهاب الكبد المصـحوب باصفرار الجلد والعينين، حكة، ظهور بول داكن اللون أو براز باهت اللون، الشعور بالتعب أو الضـعف، فقدان الشـهية، فشـل كبدي (نادر جدًا).
- التهاب البنكرياس، ويكون عادة مصحوبا بألم شديد بالبطن.

كما تم أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية؛ بشكل نادر:

- انخفاض عدد كريات الدم الحمراء (فقر الدم).
- تَنميل أو ضعف في الذراعين والساقين.
- صداع، شعور بوخز، دوخة.
- اضطرابات هضمية (ألم بالبطن، إمسـاك، انتفاخ البطن، عسـر الهضـم، إسهال، غثيان، قيء).
- طفح جلدي، حكة، تساقط الشعر.
- ضعف.
- مشاكل في النوم (نادرة جدًا).
- ضعف الذاكرة (نادرة جدًا)، فقدان الذاكرة، الارتباك

كما تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية ولكن لا يمكن تقديـر معدل تكـرارها من واقع البيانات المتاحة (معدل الحدوث غير معروف):

- اضطرابات بالانتصاب
- الاكتئاب
- التهاب بالرئتين يسبب مشاكل في التنفس تتضمن سعالًا مستمرًا و/أو ضيق بالتنفس أو حمى.
- مشـاكل بالأوتار، قد تكون في بعض الأحيان مصـحوبة بتمزق الوتر (كأحد المضـــاعفات). تم الإبلاغ عن آثار جانبية إضافية محتملة مع تناول بعض الـ "ستاتينات":
- اضطرابات في النوم، بما في ذلك الكوابيس.
- صعوبات جنسية.
- مرض الشكري. من المرجح حدوث ذلك إذا كنت تعاني من ارتفاع مسـتويات السـكر والدهون في الدم، أو زيادة الوزن وتعاني من ارتفاع ضغط الدم. سيقوم طبيبك بمتابعتك أثناء الفترة التي تتناول فيها هذا الدواء.
- ألم عضلي، أوجاع، أو ضعف دائم بالعضلات قد لا يزول بعد التوقف عن تناوُل عقار زوكور. (معدل الحدوث غير معروف).

نتائج الفحوصات المعملية

يُرجح ارتفاع في بعض فحوصات الدم المعملية الخاصة بوظائف الكبد وأحد الإنزيمات العضلية (إنزيم كيناز الكرياتين).

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك. ويشمل ذلك أية آثار جانبية مُحتملة؛ غير المدرجة في هذه النشرة.

٥. كيفية تخزين عقار زوكور

يُحفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة.

لا يخزن في درجة حرارة تتعدى ٣٠ درجة مئوية، مع مراعاة تجنب درجات الحرارة المرتفعة التي تتعدى ٥٠ درجة مئوية.

احتفظ بالشريط داخل العبوة الخارجية لحمايته من الرطوبة.

لا تتخلص من الأدوية عن طريق إلقائها في مياه الصـــرف أو مع المخلفات المنزلية. استشر الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. تُساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

محتويات عقار زوكور

المادة الفعالة هي سيمڤاستاتين (١٠ مجم، ٢٠ مجم، أو ٤٠ مجم).

المكونات الأخرى: بوتيل هيدروكســي الأنيســول (E320)، حمض الأسكوربيك (E300)، حمْض ستريك أحادي الهيدرات (E330)، سـليلوز فائق التبلور (E460)، نشا سابق التجلتن، ستيرات المغنسـيوم (E572)، ولاكتوز أحادي الهيدرات. تحتوي طبقة تغليف القرص على هيبرومليوز (E464)، هيدروكســي بروبيل السـليلوز (E463)، ثاني أكسـيد التيتانيوم (E171)، وتلك (E553b). كما تحتوي أقراص ١٠ مجم و٢٠ مجم على أكسـيد الحديد الأصفر (E172) وأكسـيد الحديد الأحمر (E172). بالإضافة إلى ذلك، تحتوي أقراص ٤٠ مجم على أكسيد الحديد الأحمر.

شكل عقار زوكور ومحتويات العبوة

يتوافر عقار زوكور بتركيزات ١٠ مجم و٢٠ مجم و٤٠ مجم

أحجام العبوة

زوكور ١٠ مجم: عبوة كرتونية تحتوي على ٢٨، و٥٦ أشـــرطة (من بولي فينيل الكلوريد/بولي إيثيلين/بولي فينيليدين الكلوريد-ألومنيوم) بكل منها ٧ أقراص.

زوكور ٢٠ مجم و٤٠ مجم: عبوة كرتونية تحتوي على ٢٨، ٥٦، و٩٨ أشـــرطة (من الألومنيوم وبولي فينيل الكلوريد) بكل منها ٧ أقراص.

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في: مارس ٢٠١٥

© ميرك شارب ودوم المحدودة ٢٠١٥. جميع الحقوق محفوظة.

PIL.ZCR.15.UK.4521-WS-253

GNP

جهة التصنيع ومالك حق التسويق

مالك حق التسويق

شركة ميرك شارب ودوم، بي في، ٣٩ فارنر فرج، ٢٠٣١ بي إن هارلم، هولندا

جهة التصنيع

زوكور ١٠ مجم

ميرك شارب ودوم المحدودة، شوتون لان، كراملينجتون، نورثمبرلند NE23 3JU

المملكة المتحدة.

تم التغليف بواسطة: شركة جلوبال نابي للأدوية

جهة التصنيع

عقار زوكور ٢٠ مجم و٤٠ مجم:

شركة جلوبال نابي للأدوية بترخيص من شركة ميرك وشركائها، الولايات المتحدة الأمريكية وفروعها في هولندا